

Betaisodona® / Betaseptic Mundipharma®

Wirkstoff: Povidon-Iod (PVP-Iod).

Apothekenpflichtig.

Betaisodona® Lösung

Zusammensetzung:

100 ml Lösung enthalten 10 g Povidon-Iod mit einem Gehalt von 11% verfügbarem Iod, mittleres Molekulargewicht von Povidon etwa 40.000. *Sonstige Bestandteile:* Glycerol, Nonoxinol 9, Dinatriumhydrogenphosphat, wasserfreie Citronensäure (Ph.Eur.), Natriumhydroxid, Kaliumiodat, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Zur einmaligen Desinfektion der intakten äußeren Haut oder Antiseptikum der Schleimhaut wie z.B. vor Operationen, Biopsien, Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen und Blasenkatheterisierungen. Zur wiederholten, zeitlich begrenzten antiseptischen Wundbehandlung z.B. Dekubitus, Ulcus cruris, Verbrennungen, infizierte und superinfizierte Dermatosen. Zur chirurgischen Händedesinfektion.

Betaisodona® Mund-Antiseptikum

Zusammensetzung:

100 ml Lösung enthalten 7,5 g Povidon-Iod mit einem Gehalt von 10% verfügbarem Iod, mittleres Molekulargewicht von Povidon etwa 40.000. *Sonstige Bestandteile:* Ethanol 96%, Levomenthol, Methylsalicylat (Ph. Eur.), Glycerol, Saccharin-Natrium 2 H₂O, Dinatriumhydrogenphosphat, wasserfreie Citronensäure, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Enthält 36 Vol.-% Alkohol.

Anwendungsgebiete: Zur einmaligen antiseptischen Behandlung der Mundschleimhaut (z.B. vor operativen Eingriffen und Prophylaxe lokaler Wundinfektionen), bei Endokarditis-gefährdeten Pat.. Zur wiederholten, zeitlich begrenzten Prophylaxe der strahlenbedingten Mukositis bei Pat. unter Radio- bzw. Radiochemotherapie.

Betaisodona® Salbe

Zusammensetzung:

100 g Salbe enthalten 10 g Povidon-Iod mit einem Gehalt von 10% verfügbarem Iod, mittleres Molekulargewicht von Povidon etwa 40.000. *Sonstige Bestandteile:* Macrogole 400, 1000, 1500 und 4000, Natriumhydrogencarbonat, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete:

Zur wiederholten, zeitlich begrenzten Anwendung als Antiseptikum bei geschädigter Haut z.B. Dekubitus (Druckgeschwür), Ulcus cruris (Unterschenkelgeschwür), oberflächlichen Wunden und Verbrennungen, infizierten und superinfizierten Dermatosen.

Betaisodona® Wundgaze

Zusammensetzung:

1 Stück Salbengaze zu 10 x 10 cm, entsprechend 4,3 g enthält: 0,3 g Povidon-Iod mit einem Gehalt von 10% verfügbarem Iod, mittleres Molekulargewicht von Povidon etwa 40.000. *Sonstige Bestandteile:* *Salbe:* Macrogole 400, 4000, 6000, gereinigtes Wasser; *Gaze:* Baumwolle.

Anwendungsgebiete:

Antiseptische Verbände; Vorbeugung von Hautinfektionen bei hoher Infektionswahrscheinlichkeit und Behandlung von Hautinfektionen; infektionshemmende Behandlung von Schnitt- und Schürfwunden und anderen Verletzungen und Verbrennungen der Haut, Wundliegen, Druckgeschwüren (Dekubitus) und infizierten Unterschenkelgeschwüren (Ulcus cruris).

Betaseptic Mundipharma®

Zusammensetzung:

100 ml Lösung enthalten 3,24 g Povidon-Iod, mit einem Gehalt von 10% verfügbarem Iod, mittleres Molekulargewicht von Povidon etwa 40.000, 38,9 g 2-Propanol, 38,9 g Ethanol 96%.

Anwendungsgebiete:

Hautdesinfektionen vor Operationen, Biopsien, Injektionen, Punktionen und Blutabnahmen. Zur Anwendung auf Schleimhäuten und offenen Wunden nicht geeignet.

Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Hyperthyreose, manifesten Schilddrüsenerkrankungen, Dermatitis herpetiformis Duhring, vor und nach einer Radio-Iod-Therapie (bis zum Abschluss der Behandlung), bekannter Überempfindlichkeit gegen Iod oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.

Nebenwirkungen:

Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut z. B. kontaktallerg. Reaktionen vom Spättyp, anaphylaktische Reaktionen oder Angioödeme, bei prädisp. Pat. Iod-induzierte Hyperthyreose.

Zusätzlich: **Betasisodona Lösung®/Betasisodona® Salbe/Betasisodona® Wundgaze:** Nach Resorption großer PVP-Iod-Mengen Elektrolytstörungen, renale Insuffizienz, schwere metabol. Azidose. Zusätzlich: **Betasisodona® Lösung/Betaseptic Mundipharma®:** Hautreizungen nach Pfützenbildung unter dem Pat.. Zusätzlich: **Betaseptic Mundipharma®:** Wegen des hohen Alkoholgehaltes der Lösung Austrocknungserscheinungen der Haut.

Warnhinweise:

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren! Packungsbeilage beachten!

Zusätzlich **Betasisodona® Mund-Antiseptikum:** Enthält 36 Vol.-% Alkohol.