

Nyxoid® 1,8 mg Nasenspray, Lösung im Einzeldosisbehältnis

Wirkstoff: Naloxonhydrochlorid-Dihydrat.

Verschreibungspflichtig.

Zusammensetzung: *Arzneilich wirksamer Bestandteil:* Jedes Nasenspray-Behältnis gibt 1,8 mg Naloxonhydrochlorid-Dihydrat ab. *Sonstige Bestandteile:* Natriumcitrat (Ph.Eur.), Natriumchlorid, Salzsäure, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Nyxoid® ist bestimmt für die sofortige Anwendung als Notfalltherapie bei bekannter oder vermuteter Opioid-Überdosierung, die sich als Atemdepression und/oder Depression des Zentralnervensystems (ZNS) manifestiert, sowohl im nicht-medizinischen als auch im medizinischen Umfeld. Nyxoid® wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 14 Jahren. Nyxoid® ersetzt nicht die Behandlung durch einen Notarzt.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Naloxon oder einen der sonstigen Bestandteile.

Nebenwirkungen: Übelkeit, Opioidentzugssyndrom, Überempfindlichkeit, anaphylaktischer Schock, Schwindel, Kopfschmerz, Tremor, Tachykardie, Arrhythmie, Bradykardie, Herzflimmern, Herzstillstand, Hypotonie, Hypertonie, Hyperventilation, Lungenödem, Erbrechen, Durchfall, Mundtrockenheit, Hyperhidrose, Erythema multiforme, Arzneimittelentzugssyndrom (bei Patienten, die von Opioiden abhängig sind).

Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor der Anwendung keinen Probestoß abgeben und nicht testen. Jedes Spray enthält nur eine Dosis. Bei Überdosierung von Opioiden (wie Heroin).

Mundipharma Corporation (Ireland) Limited, Millbank House, Arkle Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland

Örtlicher Vertreter in Deutschland: Mundipharma GmbH, 60549 Frankfurt am Main