

## **Uniphyllin® 300 mg / 400 mg / 600 mg Retardtabletten**

Wirkstoff: Theophyllin

Verschreibungspflichtig.

### **Zusammensetzung:**

1 Retardtablette enthält 300/400/600 mg Theophyllin wasserfrei.

*Sonstige Bestandteile:* Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Talkum, Macrogol 6000, Cetylstearylalkohol (Ph.Eur.), Hyetellose, Povidon (K25), gereinigtes Wasser.

**Anwendungsgebiete:** Behandlung und Verhütung von Atemnotzuständen aufgrund einer Bronchokonstriktion bei Patienten mit persistierendem Asthma bronchiale oder mittel- bis schwergradiger obstruktiver Atemwegserkrankung (z. B. chronische Bronchitis, Lungenemphysem). Arzneimittel mit verzögerter Theophyllin-Freisetzung wie Uniphyllin® 300 mg/400 mg/600 mg sind nicht zur Akutbehandlung des Status asthmaticus oder der akuten Bronchospastik bestimmt. Theophyllin sollte nicht als Mittel der ersten Wahl zur Behandlung von Asthma bei Kindern angewendet werden.

### **Gegenanzeigen:**

Überempfindlichkeit gegen Theophyllin, andere xanthinhaltige Arzneimittel oder einen der sonstigen Bestandteile, frischer Herzinfarkt, akute tachykarde Arrhythmien, Kinder unter 6 Monaten, Kinder unter 6 Jahren (mit einem Körpergewicht von unter 22 kg) bei gleichzeitiger Anwendung von Ephedrin.

### **Nebenwirkungen:**

Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich anaphylaktischer und anaphylaktoider Reaktionen, Veränderungen der Serumelektrolyte, insbesondere Hypokaliämie, Anstieg von Serum-Kalzium und -Kreatinin sowie Hyperglykämie und Hyperurikämie, Agitiertheit, Unruhe, Schlaflosigkeit, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Krampfanfälle, Schwindel, Tremor, atriale Tachykardie, Palpitationen, Sinustachykardie, Blutdruckabfall, Bronchospasmus, Übelkeit, Abdominalschmerz, Diarrhoe, epigastrische Beschwerden, gastroösophagealer Reflux, Erbrechen, Stimulation der Magensäure-Sekretion, Juckreiz, Ausschlag, Urtikaria, verstärkte Diurese, Harnverhalten (bei älteren Patienten mit obstruktiven Harnwegserkrankungen). Ausgeprägtere Nebenwirkungen können bei individueller Überempfindlichkeit oder einer Überdosierung (Theophyllin-Serumspiegel über 20 µg/ml) auftreten.

### **Warnhinweis:**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Mundipharma GmbH, 60549 Frankfurt am Main**

**12-19**