

Wenn Sie mit einer neuen Karte beginnen, bewahren Sie diese Karte bitte als Referenz für 4 Monate ab diesem Datum auf.

Patient: .....

Arzt: .....

Tel.-Nr.: .....

Beginn der Therapie mit Remsima:

.....

Datum der letzten Infusionen:

.....



Bitte bringen Sie zu jedem Arztbesuch unbedingt eine vollständige Liste aller von Ihnen angewendeten Medikamente mit.

Liste anderer Medikamente:

.....

.....

Liste der Allergien:

.....

.....

Bitten Sie Ihren Arzt, die Art und das Datum der letzten Untersuchung(en) auf Tuberkulose (Tbc) unten zu dokumentieren:

Test: .....

Datum: .....

Ergebnis: .....

**Hinweiskarte  
für Patienten**

**Remsima<sup>TM</sup>**  
Infliximab



LM107207-PA001

**Zeigen Sie diese Karte  
jedem Arzt, bei dem  
Sie in Behandlung sind.**

**Diese Hinweiskarte enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie vor und während der Behandlung mit Remsima kennen müssen.**

Es ist wichtig, dass Sie und Ihr Arzt den Markennamen und die Chargennummer Ihres Arzneimittels vermerken.

Tragen Sie diese Karte bitte während der vier Monate nach Ihrer letzten Anwendung von Remsima ständig bei sich. Nebenwirkungen können auch noch längere Zeit nach der letzten Anwendung auftreten.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage für Remsima sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.

## **| Infektionen |**

### **Vor der Behandlung mit Remsima**

- Teilen Sie Ihrem Arzt mit, wenn Sie eine Infektion haben, auch wenn es eine sehr leichte ist.
- Es ist sehr wichtig, dass Sie es Ihrem Arzt mitteilen, wenn Sie jemals eine Tuberkulose hatten oder wenn Sie in engem Kontakt mit jemandem standen, der eine Tuberkulose hatte. Ihr Arzt wird testen, ob Sie Tuberkulose haben. Bitten Sie Ihren Arzt, die Art und das Datum der letzten Untersuchung(en) auf Tuberkulose (Tbc) auf der Karte zu dokumentieren.

- Teilen Sie Ihrem Arzt mit, wenn Sie Hepatitis B haben oder wissen oder vermuten, dass Sie Träger des Hepatitis-B-Virus sind.

### **Während der Behandlung mit Remsima**

- Teilen Sie Ihrem Arzt sofort mit, wenn bei Ihnen Anzeichen einer Infektion auftreten. Anzeichen können Fieber, Gefühl von Müdigkeit, (anhaltender) Husten, Kurzatmigkeit, Gewichtsverlust, nächtliches Schwitzen, Durchfall, Wunden, Zahnprobleme, ein brennendes Gefühl beim Wasser lassen oder „grippeähnliche“ Zeichen sein.

## **| Herzinsuffizienz |**

### **Vor der Behandlung mit Remsima**

- Teilen Sie Ihrem Arzt mit, wenn Sie irgendwelche Herzprobleme wie z. B. leichte Herzinsuffizienz haben.

### **Während der Behandlung mit Remsima**

- Teilen Sie Ihrem Arzt sofort mit, wenn Sie Anzeichen eines Herzproblems bemerken (Anzeichen können Atemnot, Schwellung der Füße oder Veränderungen Ihres Herzschlags sein)